

紀南病院プロトコル委員会承認済みレジメン(一般向け)

当院では月に一度プロトコル委員会を開催し、遅滞なく住民の皆様に最新の抗がん剤治療を提供できるよう努めています。

地域がん診療連携拠点病院として各治療ガイドラインに準拠した治療を基本としています。

情報公開に当り、まず点滴を伴うプロトコル(投与の組み合わせと取り決め)のみとしました。経口抗がん剤の情報は順次更新予定です。

院内で発生させる指示(オーダー)名称は、これに個別化した情報(吐き気止めの指定など)を追加していることがあります。

化学療法は大部分を外来化療室で行いますが、入院しないと出来ない治療法もあります。医師に御相談ください。

各治療法には適応するための条件(遺伝子の状態、検査データ等)があり、検査の結果次第では投与できないものがあります。

部位	プロトコル名	投与時間	入院が必須のもの	備考
頭頸部	TPF		入院で投与となります。	
	放射線併用TPF		入院で投与となります。	
	CF		入院で投与となります。	
	FC		入院で投与となります。	
	CbF		入院で投与となります。	
	FCb		入院で投与となります。	
	放射線併用カルボプラチン		入院で投与となります。	
	放射線併用シスプラチン		入院で投与となります。	
	wパクリタキセル(6投1休)			
	放射線併用パクリタキセル			
	アービタックス+CF		入院で投与となります。	
	アービタックス+パクリタキセル			
	アービタックス単剤			
	食道	タキソテール単剤		
5-FU+CDDP(従来法)			入院で投与となります。	
放射線併用5-FU+シスプラチン(JCOG9516)			入院で投与となります。	
呼吸器	標準FP(5-FU+シスプラチン)		入院で投与となります。	シスプラチンはday1一括投与
	パクリタキセル+カルボプラチン(分割投与)			
	アバスチン+パクリタキセル+カルボプラチン			
	ナベルピン+シスプラチン(JBR10)			
	放射線併用ナベルピン+シスプラチン			
	ナベルピン単剤			
	ジェムザール単剤			
	ナベルピン+ジェムザール			
	タキソテール単剤(呼吸器)※設定量が異なります			
	ジェムザール+カルボプラチン			
	エスワン+ジェムザール(群馬大パターン)			
	アリムタ単剤			
	アリムタ+シスプラチン			
	アリムタ+カルボプラチン			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	アバスタチン+アリムタ			
	アバスタチン+アリムタ+シスプラチン			
	アバスタチン+アリムタ+カルボプラチン			
	エスワン+カンプト			
	アブラキサン単剤(B法)			
	アブラキサン+カルボプラチン			
	カルセド単剤			
	タキソテール+カンプト			
	エスワン+シスプラチン			
	エスワン+カルボプラチン			
	放射線併用パクリタキセル+カルボプラチン(6回)			
	放射線併用カルボプラチン			
	オブジーボ単剤			
	サイラムザ+タキソテール			
	手術後ナベルピン+シスプラチン			
	キートルーダ単剤			
	放射線併用タキソテール+シスプラチン			
	テセントリク単剤			
	キートルーダ+アリムタ+シスプラチン			
	キートルーダ+アリムタ+カルボプラチン			
	キートルーダ+アリムタ			
	キートルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン			
	イミフィンジ単剤			
	CRT後パクリタキセル+カルボプラチン			
	テセントリク+アブラキサン+カルボプラチン			
	ベプシド+カルボプラチン			
	放射線併用ベプシド+シスプラチン			
	カンプト+シスプラチン			
	カンプト+カルボプラチン			
	ハイカムチン単剤			
	パクリタキセル+アクブラ		休止中	
	ベプシド+シスプラチン+カンプト			
	テセントリク+ベプシド+カルボプラチン			
胃	エスワン+シスプラチン			
	エスワン+タキソテール			
	カンプト+シスプラチン(MK)			呼吸器に同じ組み合わせあり
	カンプト(A法)			
	パクリタキセル単剤			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	タキソテール単剤			
	ハーセプチン+ゼローダ+シスプラチン			
	ゼローダ+シスプラチン			
	ハーセプチン+ゼローダ			
	ハーセプチン単剤			
	ハーセプチン+エスワン+シスプラチン			
	ハーセプチン+シスプラチン			
	ハーセプチン+エスワン			
	タキソテール+シスプラチン			近年使用なし、見直し中
	アブラキサン単剤(A法)			
	サイラムザ単剤			
	サイラムザ+パクリタキセル			
	サイラムザ+アブラキサン			
	g-SOX			
	ハーセプチン+g-SOX			
	g-XELOX			
	ハーセプチン+g-XELOX			
	アブラキサン単剤(D法)			
	オブジーボ単剤			
乳腺	FEC100(5-FU+ファルモルピシン+エンドキサン)			
	FEC75(5-FU+ファルモルピシン+エンドキサン)			
	TC療法(タキソテール+エンドキサン)			
	タキソテール+ハーセプチン療法			
	パクリタキセル(週1)単剤			
	ハーセプチン+パクリタキセル(週1×3)			
	ナベルピン単剤			
	ナベルピン(2投1休)+ハーセプチン(毎週)			
	ハーセプチン単剤			
	タキソテール単剤			
	カンプト単剤(A法)			
	カンプト単剤(A法)+ハーセプチン			
	ジェムザール単剤			
	ジェムザール+ハーセプチン			
	ハラヴェン単剤			
	ハラヴェン+ハーセプチン			
	パクリタキセル+アバスチン			
	アブラキサン(A法)			
	アブラキサン(E法)+テセントリク			5月審議予定

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	パージェタ+ハーセプチン+タキソテール			
	パージェタ+ハーセプチン(維持療法)			
	カドサイラ			
	d.d.(ドーズ・デンス)-EC			
	EC			
肝臓胆管膵臓	ジェムザール単剤			
	エスワン+ジェムザール			千葉大パターン
	タルセバ+ジェムザール			
	FOLFIRINOX			
	ジェムザール+シスプラチン			
	エスワン+ジェムザール			
	アブラキサン+ジェムザール			
	低用量FP			
	肝動注アイエーコール			
結腸直腸	mFOLFOX6(フォルフォックスシックス)			
	アバスチン+mFOLFOX6			
	アービタックス+mFOLFOX6			
	ベクティビックス+mFOLFOX6			
	FOLFIRI(フォルフィリ)			
	アバスチン+FOLFIRI			
	アービタックス+FORFIRI			
	ベクティビックス+FOLFIRI			
	サイラムザ+FOLFIRI			
	ザルトラップ+FOLFIRI			
	sLV5FU2			
	アバスチン+sLV5FU2			
	アービタックス+sLV5FU2			
	ベクティビックス+sLV5FU2			
	FOLFOXIRI(フォルフォキシリ)			
	アバスチン+FOLFOXIRI			
	ベクティビックス+カンプト療法			
	ベクティビックス単剤			
	SOX(ソックス)			
	アバスチン+SOX			
	XELOX(ゼロックス)			
	アバスチン+XELOX			
	アバスチン+ゼローダ(C法)			
	ゼローダ(C法)			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	XELIRI(ゼリリ)			
	アバスチン+XELIRI			
	エスワン+カンプト(IRIS)			
	アバスチン+エスワン+カンプト			
	アバスチン+カンプト			
	アバスチン+ロンサーフ			
泌尿器(膀胱)	M-VAC(エム-バック)			
	ジェムザール+シスプラチン			
	ジェムザール+カルボプラチン			
	ジェムザール+パクリタキセル			
	ジェムザール単剤			
	ファルモルビシン40			
	ファルモルビシン60			
	マイトマイシン40			
泌尿器(精巣)	ブレオマイシン+ベプシド+シスプラチン			
	ベプシド+シスプラチン			
	ベプシド+シスプラチン(透析患者用)			
	ベプシド+イフォマイド+シスプラチン			
	パクリタキセル+イフォマイド+シスプラチン			
泌尿器(前立腺)	ドセタキセル単剤			
	ドセタキセル+エストラサイト+プレドニゾン			
	シスプラチン+UFT			
	ジェブタナ単剤			
泌尿器(腎)	トーリセル単剤			
	オブジーボ+ヤーボイ			
	オブジーボ単剤			
	キイトルーダ単剤			
泌尿器(陰茎)	パクリタキセル+イフォマイド+シスプラチン			
婦人科(卵巣、他)	分割TC(パクリタキセル+カルボプラチン)			
	d.d.(ドーズ・デンス)-分割TC			
	mTC			
	タキソテール+カルボプラチン			
	mPTX			
	分割PTX			
	カンプト単剤(A法)			
	ハイカムチン単剤			
	アバスチン+mTC			
	アバスチン単剤			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	アバスチン+ドキシル			
	アバスチン+d.d.(ドーズ・デンス)TC			
	カンプト+マイトマイシン			
	ドキシル単剤			
	ジェムザール単剤			
	ジェムザール+タキソテール			
	ドキシル+カルボプラチン			
婦人科(子宮頸部)	パクリタキセル+シスプラチン			
	放射線併用シスプラチン			
	カンプト+シスプラチン			
	パクリタキセル+シスプラチン+アバスチン(2日間)			
	エンドキサン+アドリアシン+シスプラチン			
婦人科(子宮体部)	放射線併用パクリタキセル+シスプラチン			
	ファルモルビシン+イホマイド+シスプラチン			
	アドリアシン+シスプラチン			
	タキソテール単剤			
婦人科(胚細胞腫)	ブレオ+ベプシド+シスプラチン			
婦人科(絨毛症)	MTX単剤			
	HD-MTX単剤			
	メソトレキセート+コスメゲン			
	EMA/CO			
原発不明癌	ジェムザール+タキソテール			
	エスワン+シスプラチン			
神経内分泌腫瘍	ザノサー単剤(5日間連投)			
	ザノサー単剤(週1回投与)			
肉腫	アドリアシン+イフォマイド			
	ハラヴェン単剤			
間質性肺炎	エンドキサン単剤			

血液腫瘍

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
非ホジキンリンパ腫	CHOP (オンコビン+アドリアシン+エンドキサン)			
CD20(+)	CHOP →リツキサン			
CD20(+)	リツキサン→CHOP			
CD20(+)	リツキサン+CHOP			
	mini-CHOP			
	CHOP (変法)			
CD20(+)	CHOP (変法)→リツキサン			
CD20(+)	リツキサン→CHOP(変法)			
CD20(+)	リツキサン+CHOP(変法)			
CD20(+)	CVP →リツキサン			
CD20(+)	リツキサン+CHOP			
CD20(+)	高齢者用CVP→R			
	THP-COP (オンコビン+テラルビシン+エンドキサン)			
CD20(+)	THP-COP →リツキサン			
CD20(+)	リツキサン→THP-COP			
CD20(+)	リツキサン+THP-COP			
	高齢者用THP-COP			
CD20(+)	高齢者用THP-COP →リツキサン			
CD20(+)	リツキサン→高齢者用THP-COP			
CD20(+)	リツキサン+高齢者用THP-COP			
	高齢者用THP-COP (変法)			
CD20(+)	高齢者用THP-COP (変法)→リツキサン			
CD20(+)	リツキサン→高齢者用THP-COP(変法)			
CD20(+)	リツキサン+高齢者用THP-COP(変法)			
	ESHAP			塩酸プロカルバジン必要
	EPOCH			
CD20(+)	D.A-EPOCH±リツキサン			
	mICE			
CD20(+)	R-FMD			
	mini-MEAM			
CD20(+)	R-MEAM			
	HyperCVAD			
	MA			
	MA(高齢者用)			
CD20(+)	ゼヴァリン			
	トレアキシン単剤			
CD20(+)	RIT+トレアキシン			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	DeVIC			
	2/3DeVIC			
	ジェムザール+シスプラチン+デカドロン			
CD20(+)	ガザイバ+トレアキシ			
CD20(+)	ガザイバ+CHOP			
CD20(+)	ガザイバ維持療法			
CD30(+)	アドセトリス単剤			
CD30(+)	アドセトリス+CHP			
末梢性T細胞リンパ腫	イストダックス単剤			
中枢浸潤例	高用量MTX			
成人T細胞性白血病リンパ腫	modified LSG15			
成人T細胞性白血病リンパ腫	ポテリジオ単剤			
ホジキンリンパ腫	ABVD			
CD30(+)	アドセトリス単剤			
CD30(+)	アドセトリス+AVD			
多発性骨髄腫	ベルケイド単剤(皮下注) * 数パターン有り			
	ベルケイド(皮下注)+デカドロン * 数パターン有り			
	CyBorD			
	BCD			
	BLD * 数パターン有り			
	BLD Lite			
	BMP * 数パターン有り			
	JCOG-MPB			
	ベルケイド(皮下注)+ファリーダック+デカドロン			
	VTD-PACE			
	PVD * 数パターン有り			
	ダラザレックス+レブラミド+デカドロン			
	ダラザレックス+ベルケイド+デカドロン			
	ダラザレックス+ベルケイド+メルファラン+プレドニゾロン			
	エムプリシティ+レブラミド+デカドロン			
	エムプリシティ+ベルケイド+デカドロン			
	カイプロリス+レブラミド+デカドロン			
	カイプロリス(週2)+デカドロン			
	カイプロリス(週1)+デカドロン			
	MPB(Original)			
	MPB(Modified)			
	VAD			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	大量エンドキサン			
	(モゾビル:抗がん剤ではない)			
	MEL100			
	MEL200			
急性骨髄性白血病	フィルデシン単剤			
	AML 寛解導入(イダマイシン+キロサイド 3+7)			
	AML 寛解導入(イダマイシン+キロサイド 5+7)			
	AML201 地固め第1(ノバントロン+キロサイド)			
	AML201 地固め第2(ダウノマイシン+キロサイド)			
	AML201 地固め第3(アクラシノン+キロサイド)			
	AML201 地固め第4(A-TripleV)			
	高齢者AML 寛解導入(ダウノマイシン+キロサイド)			
	高齢者AML 地固め第1(ノバントロン+キロサイド)			
	高齢者AML 地固め第2(ダウノマイシン+ベプシド+キロサイド)			
	高齢者AML 地固め第3(アクラシノン+キロサイド)			
	CAG(持続点滴)			
	CAG(皮下注)			
	s-HAM (サルベージ)			
	MEC(原法)			
	MEC(変法)			
	大量キロサイド(サルベージ)			
CD33(+)/AML	マイロターゲット単剤			
骨髄異形成症候群	ビダーザ(皮下注)			
	ビダーザ(点滴)			
急性前骨髄球性白血病	トリセノックス寛解導入療法			
	トリセノックス地固め療法			
	トリセノックス+ベサノイド寛解導入療法			
	イダマイシン+キロサイド(APL地固め第3)			
急性リンパ性白血病	ALL97 寛解導入療法			
	ALL97 地固め第1			
	ALL97 地固め第2			
	ALL97 地固め第3			
	ALL97 地固め第4			
	ALL97 地固め第5			
	ALL97 地固め第6			
	ALL97 地固め第7			

部位	プロトコール名	投与時間	入院が必須のもの	備考
	ALL97 地固め第8			
	ALL97 維持療法			
	202-U IT-Triple			
	202-U 寛解導入療法 第1週			
	202-U 寛解導入療法 第2週			
	202-U 寛解導入療法 第3週			
	202-U 寛解導入療法 第4週			
	202-U 寛解導入療法 第5週			
	202-U 寛解導入療法 第6～9週 Part1			
	202-U 寛解導入療法 第6～9週 Part2			
	202-U 寛解導入療法 第10・11週			
	202-U 寛解導入療法 第12～15週 Part1			
	202-U 寛解導入療法 第12～15週 Part2			
	202-U 維持療法 第1			
	202-U 維持療法 第2			
	202-U 維持療法 第3			
	202-U 維持療法 第4			
	ビーリンサイト			
Ph(+) ALL	ALL208+IMA療法 C1			
Ph(+) ALL	ALL208+IMA療法 C2			
CD20(+) 慢性骨髄性白血病	アーゼラ単剤			
慢性リンパ性 白血病	ベスポンサ単剤			
髄注	髄注①(キロサイド+メソトレキセート+プレドニゾン)			
	髄注②(メソトレキセート+プレドニゾン)			
本態性血小板 増多症	サイメリン療法			